

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie

ambroxolo cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Zerinol Gola menta e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Zerinol Gola menta
3. Come prendere Zerinol Gola menta
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Zerinol Gola menta
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Zerinol Gola menta e a cosa serve

Zerinol Gola menta contiene il principio attivo ambroxolo cloridrato. Il principio attivo è il componente della pastiglia che dà l'effetto terapeutico richiesto.

Zerinol Gola menta ha un effetto anestetico locale che allevia il dolore del mal di gola acuto.

Zerinol Gola menta si usa per il trattamento sintomatico del dolore acuto nel mal di gola negli adulti e nei bambini sopra i 12 anni di età.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Zerinol Gola menta

Non prenda Zerinol Gola menta

- se è allergico all'ambroxolo cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Zerinol Gola menta.

- Non deve assumere Zerinol Gola menta per più di 3 giorni. Se ha ancora dei sintomi dopo 3 giorni o se ha la febbre alta, consulti il medico.

- Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di assumere questo medicinale. Si veda anche "Zerinol Gola menta contiene sorbitolo e lattosio".
- Se è affetto da rare condizioni ereditarie di intolleranza al fruttosio.
- Se ha problemi epatici o renali, si rivolga al medico prima di usare Zerinol Gola menta.
- Zerinol Gola menta non è adatto per il trattamento delle lesioni dolorose della bocca (ad esempio, ulcere o piaghe). Se ha ulcere in bocca, consulti il medico.
- Episodi di respiro corto (dispnea) si possono osservare a causa di una malattia concomitante (ad esempio gonfiore della gola). Un'altra ragione può essere una sensazione di costrizione alla gola per l'effetto anestetico locale di Zerinol Gola menta. Un'ulteriore causa può essere una reazione allergica, che può anche causare un gonfiore alla bocca e alla gola.
- La gola e la bocca possono risultare meno sensibili del solito (intorpidimento).
- Sono stati segnalati casi di reazioni cutanee gravi associate alla somministrazione di ambroxolo cloridrato. Se manifesta un rash cutaneo (comprese lesioni di membrane mucose come bocca, gola, naso, occhi, genitali), smetta di prendere Zerinol Gola menta e contatti immediatamente il medico.

Bambini

Se ha meno di 12 anni non deve usare Zerinol Gola menta.

Altri medicinali e Zerinol Gola menta

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Ambroxolo passa nel corpo del nascituro. Zerinol Gola menta quindi, non deve essere assunto durante la gravidanza, in particolare nel primo trimestre.

Ambroxolo viene escreto nel latte materno. Zerinol Gola menta quindi, non deve essere assunto durante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti di Zerinol Gola menta sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari.

Zerinol Gola menta contiene sorbitolo, lattosio e sodio

Questo medicinale contiene 1,37 g di sorbitolo per pastiglia. Sorbitolo è una fonte di fruttosio.

Se il medico le ha detto che lei (o il bambino) è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima che lei (o il bambino) prenda questo medicinale. Il sorbitolo può causare problemi gastrointestinali e avere un lieve effetto lassativo.

Una pastiglia contiene meno di 1 mg di lattosio monoidrato (un tipo di zucchero).

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di assumere questo medicinale.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per pastiglia, cioè essenzialmente "senza sodio".

Zerinol Gola menta è adatto per i diabetici.

3. Come prendere Zerinol Gola menta

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Per adulti e bambini sopra i 12 anni, 1 pastiglia da sciogliere in bocca quando ha bisogno di alleviare il dolore. Non assuma più di 6 pastiglie al giorno.

Non usi Zerinol Gola menta per più di 3 giorni. Nel caso persistano sintomi per più di 3 giorni o ha febbre alta, consulti il medico.

Come dimostrano gli studi clinici, l'effetto anestetico locale di Zerinol Gola menta viene raggiunto in 20 minuti e il suo effetto dura per almeno 3 ore.

Se prende più Zerinol Gola menta di quanto deve

Non sono stati segnalati sintomi specifici di sovradosaggio. In caso di assunzione di troppe pastiglie (più di 6 al giorno) consulti il medico o il farmacista se compaiono dei sintomi.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verifica uno dei seguenti effetti indesiderati interrompa l'assunzione di Zerinol Gola menta e informi immediatamente il medico:

- reazione allergica con gonfiore localizzato del viso, delle labbra, della bocca, della lingua e/o della gola (angioedema). Ciò può causare una sensazione di costrizione alla gola, difficoltà a deglutire o a respirare;
- il rapido verificarsi di reazioni allergiche che interessano tutto il corpo (reazioni anafilattiche, incluso shock anafilattico).

La gravità delle reazioni allergiche può aumentare se si prende nuovamente il medicinale, o se si prende un altro medicinale con lo stesso principio attivo (vedere paragrafo 2 Cosa deve sapere prima di prendere Zerinol Gola menta).

Altri effetti indesiderati che si possono verificare:

Comune: può interessare fino a 1 persona su 10

- Sensazione di malessere (nausea).
- Intorpidimento della bocca, della lingua e della gola (ipoestesia orale e faringea).
- Alterazione del gusto (disgeusia).

Non comune: può interessare fino a 1 persona su 100

- Diarrea.
- Indigestione (dispepsia).
- Mal di stomaco (dolore alla parte alta dell'addome).
- Bocca secca.

Raro: può interessare fino a 1 persona su 1.000

- Reazioni di ipersensibilità.
- Eruzione cutanea, orticaria.
- Gola secca.

Non nota: la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili

(non è possibile effettuare una stima precisa, poiché gli effetti collaterali non si sono verificati in un gruppo di studi clinici composto da 1226 pazienti. La categoria di frequenza probabilmente non è maggiore di non comune, ma potrebbe essere inferiore).

- Reazioni anafilattiche, tra cui shock anafilattico, angioedema (rapido sviluppo di gonfiore della pelle, dei tessuti sottocutanei, della mucosa e dei tessuti sottomucosi) e prurito.
- Reazioni avverse cutanee gravi (tra cui eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson/necrosi epidermica tossica e pustolosi esantematica acuta generalizzata).
- Vomito.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico, il farmacista o l'infermiere.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Zerinol Gola menta

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul blister.

La data di scadenza (Scad.) si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni**Cosa contiene Zerinol Gola menta**

Il principio attivo è ambroxolo cloridrato. Una pastiglia contiene 20 mg di ambroxolo cloridrato.

Gli eccipienti sono:

- aroma menta (contenente gomma arabica, olio di menta cinese, maltodestrine, lattosio monoidrato);
- sorbitolo (E420);
- saccarina sodica;
- macrogol 6000;

- talco.

Descrizione dell'aspetto di Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie e contenuto della confezione

Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie sono compresse rotonde, bianche con i bordi smussati.

Entrambi i lati sono piatti.

Zerinol Gola menta 20 mg pastiglie sono disponibili in blister in plastica/alluminio e in alternativa in blister alluminio/alluminio.

Confezioni da 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50 pastiglie.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Zentiva Italia S.r.l.

Via P. Paleocapa, 7

20121 Milano

Produttore

Delpharm Reims S.A.S

10, rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

- Austria: Mucoangin® Mint
- Belgio/Lussemburgo: Mucoangin® menthe
- Francia: LYSOPAÎNE MAUX DE GORGE AMBROXOL MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et à la saccharine sodique
- Germania: Mucoangin® gegen Halsschmerzen Minze
- Italia: Zerinol® Gola menta

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Maggio 2023